


### *De belangrijkste fase begint nu: mooi houden!*

Vandaag hebben we de orthodontische apparatuur bij u of uw zoon of dochter verwijderd. Nu de apparatuur is verwijderd kan het tandvlees wat gevoelig en rood zijn met mogelijk een lichte bloeding. Dit komt vaak voor, maar verdwijnt meestal vanzelf na een aantal dagen. Er is een gecementeerde retainer ('spalkje') geplaatst om de stand van de tanden te handhaven. Het is het beste om het spalkje zo lang mogelijk te laten zitten. Bel ons zo spoedig mogelijk voor een afspraak indien er problemen zijn met het draadje, of wanneer er iets los gaat zitten. Wees alert wanneer er een stukje cement/lijm vanaf komt.

Indien het spalkje los komt, kan de stand van de tanden snel veranderen, welke door de orthodontische behandeling verbeterd waren. Zeker als de beugel er net uit is, is het erg belangrijk om het spalkje zo snel mogelijk weer vast laten zetten.

Ook na het verwijderen van de slotjesbeugel blijft het verzorgen van het gebit erg belangrijk. Na het plaatsen van een retainer achter de tanden, is het noodzakelijk om een tandenstoker of flossdraad te gebruiken om ook daar de tanden goed te reinigen.



Mocht de retainer loskomen vlak voordat je een nacontrole hebt, bel ons dan ook. Wij kunnen dan beoordelen of dit extra werk tussendoor kan worden gedaan of dat we beter een andere afspraak maken.

#### Samenvatting

- Vermijd plakkerig en hard eten zolang de retainer in de mond zit
- Neem contact op als het draadje losraakt:  
Je tanden kunnen snel van stand veranderen

P.C. Wering Orthodontist

Wernerlaan 1 • 1213 AR Hilversum • Tel 035 - 623 32 30 • [info@ortho-hilversum.nl](mailto:info@ortho-hilversum.nl) • [www.ortho-hilversum.nl](http://www.ortho-hilversum.nl)

Specialist Dentomaxillaire Orthopaedie ABN AMRO NL57ABNA0416614922 • KvK 71992839

BIG nr: 290 455 720 02

