

Evt. risico's van behandeling

Informatieblad 10

Aan een orthodontische behandeling zijn verschillende risico's verbonden. Hieronder hebben wij de risico's op een rij gezet. Mocht u hier nog vragen over hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en/of dit met de orthodontist verder te bespreken.

Ontkalkingen, cariës en tandvlees ontsteking

Het is een fabeltje dat het plaatsen van orthodontische apparatuur gaatjes veroorzaakt. Wel is het zo dat de tanden en de kiezen op de plekken die niet voldoende gereinigd worden een grotere kans hebben op het krijgen van verkleuringen en/of gaatjes. Daarom krijgt elke patiënt bij het plaatsen van orthodontische apparatuur een instructie mondhygiëne. Een advies om dagelijks mondspoelmiddel met fluoride te gaan gebruiken kan hier onderdeel van zijn. Het spreekt voor zich dat het niet goed reinigen van het gebit ook gevolgen kan hebben voor het tandvlees. Dit kan namelijk gaan ontsteken bij een slechte mondhygiëne. Ontstoken tandvlees is te herkennen aan zwelling, roodheid en bloeding.

Gevoeligheid van slijmvliezen

Vooraf na het plaatsen van de orthodontische apparatuur komt het voor dat de tanden gevoelig worden voor bijvoorbeeld koude, warmte of druk. Ook kan er irritatie ontstaan aan het wangslimvlies, op de tong of het tandvlees. Meestal zijn deze klachten van tijdelijke aard en goed op te lossen. Bijvoorbeeld bij een vaste beugel door de plekken die last veroorzaken af te dekken met wax (dat bij het plaatsen van de beugel wordt meegegeven).

Bij een uitneembare beugel kan het soms noodzakelijk zijn de beugel in de praktijk te laten bijstellen of afslijpen.

Wortelresorptie

Ten gevolge van de behandeling met orthodontische apparatuur kunnen de wortelpunten van de tanden en kiezen vaak wat stomper worden: er verdwijnt dan één tot drie mm van de wortelpunt. Dit noemen we wortelresorptie en komt ook voor bij mensen die geen beugel hebben gehad. Wanneer de wortelresorptie beperkt blijft tot een enkele millimeter is het niet schadelijk. Hoogstzelden komt het voor dat er veel meer van de wortel verdwijnt. Erfelijke aanleg en wellicht een trauma/ongeluk in het verleden kunnen hierbij een rol spelen.

Ter controle van deze wortelresorptie zal er soms tijdens, maar in ieder geval voor beëindiging van de behandeling een overzichtsröntgenfoto worden gemaakt.

Tegenvallend resultaat of het niet bereiken van het behandelingsdoel

Helaas wordt niet altijd het gewenste behandelresultaat bereikt. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren: individuele groeisnelheid en groeipotentie (weefselreactie), ernst van de gebits- en/of kaakafwijking, kapotte apparatuur, maar vooral niet- of onvoldoende dragen van de apparatuur.

Recidief

Tanden en kiezen hebben de neiging om na correctie de oorspronkelijke stand "op te zoeken". Dit noemen we recidief. Om recidief tegen te gaan, zal na het beëindigen van de actieve orthodontische behandeling vaak een spalk worden geplaatst om het bereikte resultaat vast te houden. Deze spalk wordt achter de tanden geplaatst om recidief te voorkomen. Indien noodzakelijk zal, naast de spalk, een nachtbeugel geplaatst worden.

P.C. Wering Orthodontist

Wernerlaan 1 • 1213 AR Hilversum • Tel 035 - 623 32 30 • info@ortho-hilversum.nl • www.ortho-hilversum.nl

Specialist Dentomaxillaire Orthopaëdie ABN AMRO NL57ABNA0416614922 • KvK 71992839

BIG nr: 290 455 720 02

